A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

Corrigé du brevet des collèges Métropole La Réunion [1]
20 septembre 2018

Durée : 2 heures

Exercice 1 **20 points**

Partie 1

1. Il y a 32 femmes sur un total de 80 participants ; le pourcentage de femmes est donc : $\frac{32}{80} \times 100 = \frac{8 \times 4}{8 \times 10} \times 100 = \frac{4}{10} \times 100 = \frac{2}{5} \times 100 = 40$. Il y a 40 % de femmes.
2. **a.** Vert correspond à un homme et il y a $80 - 32 = 48$ hommes, donc $p(V) = \frac{48}{80} = \frac{8 \times 6}{8 \times 10} = \frac{6}{10} = \frac{60}{100} = 60\,\%$.
   Remarque : on aurait pu faire directement le complément à 100 % des 40 % de femmes.
   b. Il y a deux 10, deux 20, deux 30 et un 40, soit en tout 7 dossards dont le numéro est un multiple de 10.
   La probabilité de cet évènement est donc $p(M) = \frac{7}{80}$.
   c. Sur les 7 multiples de 10, 3 sont ceux d'une femme. La probabilité est donc égale à $\frac{3}{7}$.

Partie 2

1. Il y a 10 coureurs nés avant 1980 et 10 coureurs nés après 1980 ; 1980 est donc la médiane de cette série.
2. On écrit dans la cellule B23 : =SOMME(B2 : B21)/20
3. En général la moyenne calcul de la somme divisé par le nombre d'éléments n'est pas égal à la médiane qui partage la série en deux séries de même effectif.

Exercice 2 **11 points**

1. Le nombre 588 peut se décomposer sous la forme $588 = 2^2 \times 3 \times 7^2$.
   Les diviseurs premiers de 588 sont 2 ; 3 et 7.
2. **a.** $27\,000\,000 = 27 \times 1\,000\,000 = 3^3 \times 10^6 = 3^3 \times (2 \times 5)^6 = 3^3 \times 2^6 \times 5^6 = 2^6 \times 3^3 \times 5^6$.
   b. Les diviseurs premiers de 27 000 000 sont 2 ; 3 et 5
3. Les premiers nombres impairs premiers sont 3 ; 5 et 7, donc le plus petit entier impair admettant trois diviseurs premiers différents est $3 \times 5 \times 7 = 105$.

Exercice 3 **13 points**

1. La vitesse est l'inverse de l'allure ; donc sa vitesse moyenne est $\frac{1}{6}$ en km/min soit $60 \times \frac{1}{6} = 10$ (km/h).

1. Antilles–Guyane

Plus des epreuves sur https://mesepreuves.xyz

2. Soit f la fonction définie pour tout $x > 0$ par $f(x) = \dfrac{60}{x}$, où x est l'allure en min/km et $f(x)$ est la vitesse en km/h.

Cette fonction permet donc de connaître la vitesse (en km/h) en fonction de l'allure (en min/km).


a. Non car une fonction linéaire est de la forme $f(x) = ax$, avec a nombre constant.

b. On a $f(5) = \dfrac{60}{5} = 12$.

Lors de sa dernière course, la vitesse moyenne de Bob était de 12 km/h.

3. **a.** On lit sur la figure que 10 a pour antécédent 6 : une allure de 6 min/km correspond à une vitesse de 10 km/h.

b. On lit sur la figure que 14 a pour image à peu près 4,3 : une allure de 14 min/km correspond à une vitesse d'environ 4,3 km/h.



Exercice 4 **17 points**

Les abeilles ouvrières font des allers-retours entre les fleurs et la ruche pour transporter le nectar et le pollen des fleurs qu'elles stockent dans la ruche.

1. La charge pour une abeille représente $\dfrac{80}{100} = 80\,\%$ de son poids.

Si l'homme faisait comme les abeilles il porterait : $75 \times \dfrac{80}{100} = 75 \times 0,8 = 60$ (kg).

2. **a.** Le volume d'une alvéole est : $23 \times 11,5 = 264,5$ mm^3.

b. On a 6×10^{-5} (litre) $= 6 \times 10^{-5}$ (dm^3) $= 6 \times 10^{-5} \times 10^6$ (mm^3) $= 60$ (mm^3).

Donc $\dfrac{264,5}{60} \approx 4,4$: il faut donc 5 sorties à l'abeille pour remplir une alvéole.

Plus des epreuves sur https://mesepreuves.xyz

3. **a.** En 2016 ont été produites : $3\,965+1\,869+4\,556+5\,709=16\,099$ tonnes de miel.

b. Le pourcentage de baisse de la récolte de miel entre 2015 et 2016 est égal à : $\dfrac{24\,224-16\,099}{24\,224}\times 100\approx 33,54\,\%$.

Exercice 5 **15 points**

1.



2. Les coordonnées sont celles du point de départ et l'orientation à 90°.

3. **a.**



b. À la fin de l'exécution du programme la longueur est de $50\times 1,3=65$ et la largeur à $30\times 1,3=39$.

Exercice 6 **12 points**

1. On obtient à gauche : $1\to 2\to -3$ et à droite : $1\to 3\to 5$, donc à la fin $-3\times 5=-15$.

2. On obtient à gauche : $x\to 2x\to 2x-5$ et à droite : $x\to 3x\to 3x+2$, donc à la fin $(2x-5)(3x+2)$: c'est B.

3. On a $D=(3x+2)[(3x+2)-(x+7)]=(3x+2)(3x+2-x-7)=(3x+2)(2x-5)=2x-5)(3x+2)=B$: Lily a raison.

Exercice 7 **12 points**

La figure ci-dessous n'est pas représentée en vraie grandeur.




Figure 2

Plus des epreuves sur https://mesepreuves.xyz

1. Le triangle DEF étant rectangle en E, le théorème de Pythagore permet d'écrire :
$DF^2 = DE^2 + EF^2$ ou $EF^2 = DF^2 - DE^2 = 3\,800^2 - 3\,790^2 = 14\,440\,000 - 14\,364\,100 = 75\,900$, d'où
$EF = \sqrt{75\,900} \approx 275,499$ soit 275,5 (m) au dixième près.

2. Dans le triangle DEF rectangle en E, on a $\sin \widehat{GFH} = \dfrac{GH}{FH}$, d'où :
$GH = FH \times \sin \widehat{GFH} = 4\,100 \times \sin 12° \approx 852,4$environ.

3. Le dénivelé total est donc : $275,5 + 852,4 = 1\,127,9$ pour un temps de $\dfrac{48}{60} = \dfrac{8}{10} = \dfrac{4}{5} = 0,8$.
La vitesse ascensionnelle est donc égale à :
$\dfrac{1\,127,9}{0,8} \approx 1\,409,9 > 1\,400$ (m/h) : le coureur a atteint son objectif.

Plus des epreuves sur https://mesepreuves.xyz